

GUÍA PEDAGÓGICA N°3
CIENCIAS NATURALES
FÍSICA
2° MEDIO

DOCENTE: ALEJANDRO FLORES

CONTACTO: alejandroflores2006@gmail.com
(indicando nombre y curso)

MOVIMIENTOS VARIADOS

CLASIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS POR SU VELOCIDAD

➤ **UNIFORMES:** La velocidad es constante, es decir, su valor no cambia a través del tiempo. Lo que significa que el móvil recorre distancias iguales en intervalos de tiempo iguales.

Ejemplo: M. R. U.

➤ **VARIADOS:** La velocidad no es constante, lo que significa que su valor cambia a través del tiempo ya sea aumentando o disminuyendo.

Ejemplos: Los movimientos Acelerados y los movimientos Retardados.



ACELERACIÓN

La aceleración corresponde al cambio de velocidad que experimenta un cuerpo (aumento o disminución) en un determinado tiempo. Relaciona la variación (cambio) de la velocidad y el tiempo que tarda en ocurrir.

$$\text{aceleración} = \frac{\text{variación de velocidad}}{\text{tiempo empleado}}$$

➤ IMPORTANTE RECORDAR:

La velocidad del móvil debe estar expresada en metros por segundo $\left[\frac{\text{m}}{\text{s}}\right]$, de no ser así debemos realizar la transformación respectiva. Y el tiempo debe estar expresado en segundos [s].

ACELERACIÓN

La expresión matemática utilizada para calcular el valor de la aceleración, es la siguiente:

$$a = \frac{V_f - V_i}{t}$$

UNIDAD DE MEDIDA:

$$\frac{\text{metro}}{\text{segundo}^2} \left[\frac{m}{s^2} \right]$$

a: aceleración

V_f : velocidad final que alcanza el móvil

V_i : velocidad inicial que posee el móvil

t: tiempo en cual cambia la velocidad

Dependiendo del sistema de referencia elegido la aceleración puede ser positiva o negativa.

IMPORTANTE

Para nuestro estudio tendremos las siguientes consideraciones:

- 1) Si la aceleración del móvil es **positiva (+)** significará que la velocidad de dicho móvil **AUMENTA**.
- 2) Si la aceleración del móvil es **negativa (-)** significará que la velocidad de dicho móvil **DISMINUYE**.
- 3) Si la aceleración del móvil es **nula (0)** significará que la velocidad del móvil es **CONSTANTE**, es decir, no cambia; lo que corresponde a un movimiento uniforme.

EJEMPLO N°1:

Un automóvil **parte del reposo** hasta alcanzar una velocidad de **80 [m/s]** en un tiempo de **40 segundos**. Calcule la aceleración del vehículo.

DESARROLLO:

$$a = \frac{V_f - V_i}{t} = \frac{80 - 0}{40} = \frac{80}{40} = 2 \left[\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right]$$

El resultado obtenido (**positivo**) nos indica que la velocidad del móvil aumenta.

Si la aceleración es de 2 [m/s²] significa que: por cada segundo que pasa, la velocidad del móvil **AUMENTARÁ** en 2 [m/s].

EJEMPLO N°2:

Un automóvil, que se desplaza por la carretera, se mueve a una velocidad de **90 [m/s]**, repentinamente debe cambiar su velocidad hasta llegar a los **60 [m/s]** en un tiempo de **2 minutos**. Calcule la aceleración del vehículo.

(OJO: PARA TRANSFORMAR DE MINUTOS A SEGUNDOS, DEBEMOS MULTIPLICAR LA CANTIDAD DE MINUTOS POR 60)

DESARROLLO:

$$a = \frac{V_f - V_i}{t} = \frac{60 - 90}{(2 \times 60)} = \frac{-30}{120} = -0,25 \left[\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right]$$

El resultado obtenido (**negativo**) nos indica que la velocidad del móvil disminuye.

Si la aceleración es de $-0,25 \text{ [m/s}^2\text{]}$ significa que: por cada segundo que pasa, la velocidad del móvil **DISMINUIRÁ** en $0,25 \text{ [m/s]}$.

MOVIMIENTOS RECTILÍNEOS CON ACCELERACIÓN CONSTANTE

• *MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME ACELERADO (M. R. U. A.)*

El móvil aumenta uniformemente su velocidad.

Los vectores velocidad y aceleración tienen igual dirección y sentido.



• *MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME RETARDADO (M. R. U. R.)*

El móvil disminuye uniformemente su velocidad.

Los vectores velocidad y aceleración tienen igual dirección, pero sentidos opuestos.



Observación:

El movimiento retardado (M. R. U. R.) está asociado al concepto de *frenar*, ya que dicha acción tiene como consecuencia una disminución de la velocidad; y por lo tanto en este tipo de movimiento la aceleración tendrá signo *negativo (-)*.

ECUACIONES PARA M. R. U. A. – M. R. U. R.

1. ECUACIÓN de ITINERARIO:

Permite determinar la posición final del móvil en un determinado instante de tiempo.

$$X_f = X_i + (V_i \times t) + \left(\frac{1}{2} \times a \times t^2 \right)$$



X_f : posición final, se mide en metros [m]

X_i : posición inicial, en metros [m]

V_i : velocidad inicial, en [m/s]

t: tiempo (en segundos)

a: aceleración



Si en un problema no se entrega el valor de la posición inicial (X_i), asumiremos que dicho valor es *cero (0)*

2. ECUACIÓN de VELOCIDAD:

Permite determinar la velocidad final del móvil en un tiempo determinado.

$$V_f = V_i + (a \times t)$$

V_f : velocidad final, medida en [m/s]

V_i : velocidad inicial, expresada en [m/s]

t : tiempo (en segundos)

a : aceleración

EJEMPLO N°1:

En una pista de despegue, un avión a reacción parte del reposo y después de 30 segundos, alcanza una velocidad de 600 [m/s].

Teniendo en cuenta lo anterior, determine:



1) ACELERACIÓN DEL AVIÓN

2) POSICIÓN FINAL (X_f) DEL AVIÓN A LOS 40 SEGUNDOS

3) VELOCIDAD DEL AVIÓN (V_f) A LOS 15 SEGUNDOS DE HABER PARTIDO

DESARROLLO:

1) Para calcular la aceleración debemos utilizar los datos que nos entregan en el enunciado del problema:

En una pista de despegue, un avión a reacción **parte del reposo** y después de **30 segundos**, alcanza una velocidad de **600 [m/s]**.

Entonces, al aplicar la fórmula para la aceleración tendríamos:

$$a = \frac{V_f - V_i}{t} = \frac{600 - 0}{30} = \frac{600}{30} = 20 \left[\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right]$$

DESARROLLO:

2) Para conocer la posición final (X_f) del avión, a los 40 [s], debemos utilizar la ecuación de itinerario y reemplazar en ella los datos que conocemos.

$$X_f = X_i + (V_i \times t) + \left(\frac{1}{2} \times a \times t^2 \right)$$

$\frac{1}{2} = 0,5$

$$X_f = 0 + (0 \times 40) + (0,5 \times 20 \times 40^2)$$


$$X_f = 0 + 0 + (0,5 \times 20 \times 1.600)$$

$$X_f = 0 + 0 + 16.000$$

$$X_f = 16.000 \text{ [m]}$$

DESARROLLO:

3) Para conocer la velocidad (V_f) del avión, a los 15 [s], debemos utilizar la ecuación de velocidad y reemplazar en ella los datos que conocemos.

$$V_f = V_i + (a \times t)$$


$$V_f = 0 + (20 \times 15)$$


$$V_f = 0 + 300$$

$$V_f = 300 \left[\frac{\text{m}}{\text{s}} \right]$$

EJEMPLO N°2:

En una competencia, un ciclista se mueve a una velocidad de 25 [m/s]; para adelantar a otro competidor, aumenta su velocidad de manera constante con una aceleración de 15 [m/s²].

¿Cuál es la velocidad final que alcanza el ciclista luego de 4 segundos de haber comenzado a acelerar?



DESARROLLO:

Para conocer la velocidad final (V_f) del ciclista a los **4 [s]** debemos utilizar la ecuación de velocidad y en ella reemplazar los datos que nos entregan en el enunciado:

En una competencia, un ciclista se mueve a una velocidad de **25 [m/s]**; para adelantar a otro competidor, aumenta su velocidad de manera constante con una aceleración de

15 [m/s²].

$$V_f = V_i + (a \times t)$$

$$V_f = 25 + (15 \times 4)$$

$$V_f = 25 + 60$$

$$V_f = 85 \left[\frac{\text{m}}{\text{s}} \right]$$

ACTIVIDAD

Copie en su cuaderno y desarrolle el siguiente ejercicio asociado a los contenidos tratados en el presente documento.

❖ Un camión parte desde el reposo hasta alcanzar una velocidad de 60 (m/s) en un tiempo de 45 segundos , teniendo en cuenta lo anterior, determine lo siguiente:

1) Aceleración del móvil. (4 PUNTOS)

2) Velocidad final del móvil a los 30 segundos . (4 PUNTOS)

3) Posición final del móvil a los 2 minutos . (4 PUNTOS)

→ ESTA ACTIVIDAD DEBE SER COPIADA EN SU CUADERNO Y DESARROLLADA. LAS FOTOGRAFÍAS DEL DESARROLLO DEBERÁN SER ENVIADAS AL CORREO ELECTRÓNICO INDICADO EN LA PORTADA DE ESTE DOCUMENTO (alejandroflores2006@gmail.com), INDICANDO NOMBRE DEL ALUMNO Y SU CURSO.

➤ PLAZO DE ENTREGA:

HASTA EL DÍA LUNES 11 DE MAYO